

**BIJSLUITER**  
Panacur® Petpaste

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland	<u>Vertegenwoordigd door:</u> MSD Animal Health BVBA Lynx Binnenhof 5 1200 Brussel
Intervet Productions S.A. Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrijk	

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur® Petpaste 187,5 mg/g orale pasta voor honden en katten

**3. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN**

1 g pasta voor orale toediening bevat:

**Werkzaam bestanddeel:**

Fenbendazole 187,5 mg

**Excipiëntia:**

Methyl-4-hydroxybenzoaat (E218) 1,7 mg  
Propyl-4-hydroxybenzoaat (E216) 0,16 mg

**4. INDICATIES**

Voor de behandeling van infecties met gastro-intestinale nematoden bij kittens, volwassen katten, puppies en honden. Bij honden tevens als hulp voor de controle op de protozoa *Giardia*.

Kittens en volwassen katten:

Infecties met volgende gastro-intestinale nematoden:

- *Toxocara cati* (volwassen stadia)
- *Ancylostoma tubaeforme* (onvolwassen en volwassen stadia).

Puppies en volwassen honden:

Infecties met volgende gastro-intestinale parasieten:

- *Toxocara canis* (volwassen stadia)
- *Ancylostoma caninum* (volwassen stadia)
- *Uncinaria stenocephala* (onvolwassen en volwassen stadia)
- *Giardia* spp.

**5. CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij drachtige teven tot dag 39.

Niet gebruiken bij drachtige kattinnen.

## 6. BIJWERKINGEN

Behandelde dieren kunnen occasioneel braken en een milde diarree ontwikkelen tengevolge van de ontwormingsbehandeling.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## 7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden en katten.

## 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Elke injector bevat 4,8 g pasta, equivalent aan 900 mg fenbendazole. De stamper heeft 18 onderverdelingen; elke onderverdeling komt overeen met 50 mg fenbendazole. Het gewenste aantal eenheden kan gekozen worden door een ring te verdraaien op de stamper.

Panacur Petpaste is geschikt voor toediening aan gezelschapsdieren tot 6 kg LG, ongeacht de leeftijd van het dier. Indien het lichaamsgewicht van het te behandelen dier meer dan 6 kg bedraagt, moet er meer dan 1 injector gebruikt worden.

### Volwassen katten:

*Dosis:* 75 mg fenbendazole/kg LG/dag, gedurende 2 opeenvolgende dagen.

Een dagelijkse dosering voor 2 kg LG komt overeen met 3 onderverdelingen van de stamper. Hieruit vloeit het volgend behandelingsschema voort:

Tot 2 kg LG	dagelijks	3	onderverdelingen van de stamper gedurende 2 dagen.
2,1 tot 4 kg LG	dagelijks	6	onderverdelingen van de stamper gedurende 2 dagen.
4,1 tot 6 kg LG	dagelijks	9	onderverdelingen van de stamper gedurende 2 dagen.

Enz.

Voor het berekenen van een juiste dosering dient het lichaamsgewicht van het te behandelen dier zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden.

### Kittens/puppies en volwassen honden:

*Dosis:* 50 mg fenbendazole/kg LG/dag, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Een dagelijkse dosering voor 1 kg LG komt overeen met 1 onderverdeling van de stamper. Hieruit vloeit het volgend behandelingsschema voort:

Tot 0,9 kg LG	dagelijks	1	onderverdeling van de stamper gedurende 3 dagen.
1,0 tot 2 kg LG	dagelijks	2	onderverdelingen van de stamper gedurende 3 dagen.
2,1 tot 3 kg LG	dagelijks	3	onderverdelingen van de stamper gedurende 3 dagen.
3,1 tot 4 kg LG	dagelijks	4	onderverdelingen van de stamper gedurende 3

4,1 tot 5 kg LG	dagen. dagelijks 5	onderverdelingen van de stamper gedurende 3 dagen.
5,1 tot 6 kg LG	dagelijks 6	onderverdelingen van de stamper gedurende 3 dagen.

Enz.

Voornamelijk bij hoge infectiedruk kan de uitdrijving van *Ancylostoma tubaeformis* bij volwassen katten, van *Giardia* spp. bij honden, en van ascariden vooral bij puppies en kittens, bij een individueel dier onvoldoende zijn, zodat er voor mensen nog steeds een risico bestaat voor infectie.

Een diergeneeskundig controle-onderzoek dient uitgevoerd te worden. Indien nodig volgens het oordeel van de dierenarts, volgt een herbehandeling.

## 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Panacur Petpaste wordt na het voeren rechtstreeks in de mond toegediend door de pasta uit de injector op de tongbasis te knijpen.

De pasta kan ook onder het eten gemengd worden.

## 10. WACHTTIJD

-

## 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25 °C

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

## 12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Vermijd zoveel mogelijk direct contact met de huid.

Handen wassen na gebruik.

Personen met een gekende overgevoeligheid voor het actief bestanddeel of één van de hulpstoffen dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden.

Na frequent, herhaaldelijk gebruik van een anthelminticum van een welbepaalde klasse kan zich parasitaire resistentie tegen die klasse van anthelmintica ontwikkelen.

Niet gebruiken bij drachtige teven tot dag 39.

Panacur Petpaste kan gebruikt worden bij drachtige teven in het laatste derde van de dracht.

Aangezien in zeldzame gevallen teratogene effecten veroorzaakt door de metaboliet oxfendazole niet volledig uitgesloten kunnen worden, dient het behandelen van drachtige teven enkel te gebeuren na een risico/baten analyse uitgevoerd door de verantwoordelijke dierenarts.

Niet gebruiken bij drachtige kattinnen.

Het product mag gebruikt worden bij lacterende teven en kattinnen.

Na behandeling van honden met 3 x de aanbevolen dosering of voor een periode die 3 x de aanbevolen behandelingsduur bedraagt, kan het ontstaan van een voorbijgaande lymfoïde hyperplasie in de maagmucosa waargenomen worden.

Deze bevindingen hebben geen enkele klinische relevantie.

Bij katten werden geen ongewenste effecten waargenomen na overdosering volgens hetzelfde behandelingsschema.

### **13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

### **14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

Januari 2013

### **15. OVERIGE INFORMATIE**

Verpakkingseenheden: buitenverpakking met 1 of 10 injectoren.  
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

**Registratienummer:** BE-V271652

**Afleveringswijze:** Vrij