

STRONGHOLD PLUS spot-on oplossing voor katten • Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – REG NL 118801/118802/118803-EU/2/16/204/001–006 • UDA • **Werkzame bestanddelen:** selamectine, sarolaner • **Doeldier:** Kat • **Indicaties:** Uitsluitend geïndiceerd wanneer tegelijkertijd toepassing tegen teken én een of meerdere van de andere doelparasieten aangewezen is. Behandeling en preventie van vlooiëinfestaties (*Ctenocephalides* spp.). Onmiddellijke en aanhoudende vlo-dodende werking tegen nieuwe infestaties gedurende 5 weken. Kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis. Behandeling van tekeninfestaties. Onmiddellijke en aanhoudende acaricide werking gedurende 5 weken tegen *Ixodes ricinus* en *Ixodes hexagonus* en 4 weken tegen *Dermacentor reticulatus* en *Rhipicephalus sanguineus*. Behandeling van oormijten (*Otodectes cynotis*). Behandeling van infestaties met bijtende luizen (*Felicola subrostratus*). Tekenen moeten aanhechten aan de gastheer en beginnen met voeden om aan sarolaner te worden blootgesteld. Behandeling van volwassen rondwormen (*Toxocara cati*) en volwassen intestinale haakwormen (*Ancylostoma tubaeforme*). Preventie van hartwormziekte veroorzaakt door *Dirofilaria immitis* indien maandelijks toegediend. • **Toedieningswijze en dosering:** Enkelvoudige spot-on (topicale) dosis in een minimum dosering van 6 mg/kg selamectine en 1 mg/kg sarolaner. Zie bijsluiter. • **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij zieke katten of katten die verzwakt zijn en ondergewicht hebben (voor grootte en leeftijd). Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. • **Bijwerkingen:** Milde en voorbijgaande pruritus op de plaats van toediening. Soms: milde tot matige alopecia op de plaats van toediening, erytheem en kwijlen. Zeer zelden en in de meeste gevallen van voorbijgaande aard: neurologische verschijnselen (convulsies, ataxie) en maag Darmverschijnselen (braken, diarree). • **Speciale waarschuwingen & Bijzondere voorzorgen:** Gebruik van dit diergeneesmiddel is geïndiceerd bij katten van ten minste 8 weken oud met een lichaamsgewicht van minimaal 1,25 kg. Tekenen moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan sarolaner; de overdracht van teekgebonden infectieziekten kan daarom niet worden uitgesloten. Dit diergeneesmiddel is niet werkzaam tegen volwassen *D. immitis*. Veiligheid tijdens dracht en lactatie of bij fokdieren is niet bewezen; uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Tijdens klinische veldproeven werden geen interacties waargenomen tussen dit diergeneesmiddel en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen. In geval van accidentele ingestie, onmiddellijk een arts raadplegen. Het diergeneesmiddel kan oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen alsook hand-oogcontact. Vermijd direct contact met behandelde dieren tot de plaats van toediening droog is. Na gebruik handen wassen. Mensen met een gevoelige huid of bekende allergie voor dit type diergeneesmiddelen dienen het diergeneesmiddel met voorzichtigheid te hanteren. Uiterst brandbaar. Zie bijsluiter. • **Nadere informatie:** zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de lokale vertegenwoordiger: Zoetis B.V.- Postbus 81055 -3009 GB Rotterdam -Nederland (e-mail: info.nl@zoetis.com).

GEBRUIKT: SPC 20December2021